

크리스탄S질좌제 설명서

Size : 110 x 140 (mm)

수정사항

1. 로고 변경
2. 포장단위 상세기재
3. 설명서하단 그 외 주의사항
(※ 표시부분) - 내용 수정
4. 개정년월일 변경



광범위 질염치료제

크리스탄S

질좌제

니후라텔 · 니스타틴

일반의약품
616 : 주로 곰팡이, 원충에 작용하는 것.

[성분·함량] 1좌제(2,002mg) 중
주성분 : 니후라텔(별규) ... 500mg
니스타틴(KP) ... 200,000IU

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) ... 0.77mg
파라옥시벤조산프로필(KP) ... 0.19mg

[성상]

미황색의 우상내용액을 함유한 황색의 타원형 질좌제

[효능·효과]

1. 유효균종 : 칸디다균, 트리코모나스, 세균
2. 적응증 : 외음부 질염

[용법·용량]

성인 1회 1좌제, 1일 1회 질내에 깊숙이 삽입하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
니스타틴 또는 니후라텔에 과민반응이 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 문서를 소지하십시오.
1) 이 약 투여에 의해 국소증상(국소부기), 발적(홍혈되어 붉어짐), 반구진성 발진(반삿을 발진), 가려움, 화끈거림, 질자극감, 질 분비물, 질 건조감, 질 알레르기증상, 생리 지숙 등의 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중단하십시오.
2) 장기 투여 시 감각현상(과민상태로 만들)이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용하고, 만약 감각증상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 성관계기간 동안에는 사용을 피하십시오.
2) 이 약은 국소용이므로 내복하지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[포장단위] 5개(5개/PTP X 1)

[제조자]

(주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

[제조회자]

신풍제약(주), 경기도 안산시 단원구 원시로 7

- ※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사, 약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다. 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대하여 보상해 드립니다.
- ※ 본사는 고객상담 전용 수신자부담 전화(080-200-0101)를 운영하고 있습니다.
- ※ 의사, 약사는 의약품 등의 투여 사용 중 이상사례나 약물이상반응이라고 판단되는 경우 이를 의약품 안전성 정보 보고 절차에 따라 전화, 팩스, 전자문서 또는 인터넷을 통해 식약처장, 관련 협조단체장 또는 제조업자에게 보고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 최신의 의약품안전성 정보는 신풍제약(주) 홈페이지(www.shinpoong.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

401

설명서 작성년월일 20061110

개정년월일 20161219

신풍제약주식회사
<http://www.shinpoong.co.kr>