

[전성분표시]
바로코민골드정 설명서

Size : 120 × 200 (mm)

수정사항

1. 그 외 주의사항 문구 추가
 (※ 부작용 보고 및 피해규정 신청)



아연 함유 종합비타민제

바로코민골드정

일반의약품

316 : 혼합비타민제
 (비타민 A, D 혼합제제를 제외)

바로코민골드정은

- 피로 물질의 분해와 배설을 도와주는 비타민 B₁, B₂, B₆가 함유되어 눈의 피로와 근육통을 덜어주며, 구내염과 피부 부염을 완화시켜줍니다.
- 항산화 효과를 나타내는 비타민 C가 햇빛으로 인한 기미 주근깨를 완화해 주고, 비타민 E가 혈액순환을 도와줍니다.
- 임신이나 수유 중 또는 체력이 저하되었을 경우 육체피로를 덜어줍니다.
- 필수 미네랄인 아연이 1일 권장량의 150% 함유되어 있습니다.

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분: 폴산(KP)	0.4mg
리보플라빈(KP)	15.0mg
피리독신염산염(KP)	20.0mg
토코페롤아세테이트50%과립(별규) (토코페롤아세테이트로서 30mg)	60.0mg
니코틴산아미드(KP)	100.0mg
판토텐산칼슘(KP)	20.0mg
황산아연일수화물(USP)	61.74mg
(아연으로서 22.5mg)	
시아노코발라민1000배산(KP)	12.0mg
(시아노코발라민으로서 12μg)	
아스코르브산97%과립(별규)	257.73mg
(아스코르브산으로서 250mg)	
티아민질산염3배산(KP)	45.0mg
(티아민질산염으로서 15mg)	

기타첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 레드85F450001, 오파드라이흰색(OY-C-7000A), 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】 적갈색의 양쪽이 볼록한 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세이상 및 성인 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자

- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 10) 우발적으로 과량복용한 경우
 - 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정(10정/PTP×10), 200정(10정/PTP×20)

【제조원 주소】 경기도 안산시 단원구 원시로 7

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사, 약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다. 본 제품은 소비자기해보호규정(재정경제부고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대하여 보상해 드립니다.
- ※ 본사는 고객상담 전용 수신자부담 전화(080-200-0101)를 운영하고 있습니다.
- ※ 의사, 약사는 의약품 등의 투여 사용 중 이상사례나 약물이상반응이라고 판단되는 경우 이를 의약품 안전성 정보 보고 절차에 따라 전화, 팩스, 전자문서 또는 인터넷을 통해 식약처장, 관련 협조단체장, 또는 제조업자에게 보고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 최신의 의약품안전성 정보는 신풍제약㈜ 홈페이지(www.shinpoong.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

5136
 설명서 작성년월일 20160831
 개정년월일 20181112